

**Vlastnosti:**

Klaucid je dezinfekční přípravek pro lavážní vany, dezinfekční rohože i na širokou plochu. Slouží také k dezinfekci kol motorových vozidel i k dezinfekci gumových bot v dezinfekčních vanách (poměr 1:100). Klaucid je velmi šetrný k materiálu a vyznačuje se velmi dobrým účinkem i při nízkých teplotách do 4°C.

Klaucid je ověřen proti virům kulhavky a slintavky.

Použití	Poměr Klaucid: voda	Doba působení
Dezinfekční koupel v lavážní vaně	1 : 100	
Bakterie	1 : 100	2 hodiny
Anaerobní hniloba paznehtů - dermatitis digitalis	1 : 100	2 hodiny
Plísně	1 : 100	2 hodiny
Viry obalené	2 : 100	1 hodina
Viry neobalené	2 : 100	4 hodiny

Doporučení: Silně znečištěný roztok podle potřeby 1x týdně nahradte čerstvým roztokem.

Doporučená teplota pro skladování:


Chraňte před mrazem a skladujte na dobře větraném místě při teplotě 4 až 20°C.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby

Nakládání s odpady: Nebezpečný odpad podle evropského katalogu odpadů (AVV). Jestliže recyklace není možná, musí být zlikvidovány dle souladu s místními předpisy pro odpady. Kontaminované obaly musí být zneškodněny jako nádoby se škodlivými zbytky. JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRAZDNE OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI. Zbytky mohou způsobit výbuch. Prázdné obaly nevhazujte do domovního odpadu.

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstr.1, 83113 Neubuern
Tel. +49(0)8035-90260
www.schopf-hygiene.de

Klaucid Koncentrát



Dezinfekční přípravek pro lavážní vany i dezinfekční rohože

Je testován podle
metody Německé
Veterinární
Společnosti
(DVG)

SCHOPF
HYGIENE

První pomoc:

Obecné poznámky: Ihned odstraňte znečištěný oděv. Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě.

V případě vdechnutí: Zajistěte si přísun čerstvého vzduchu, v případě potřeby vyhledejte lékaře.

Při styku s pokožkou: Ihned odstraňte znečištěný oděv. Umyjte pokožku důkladně mýdlem a vodou. Pokrytí rány sterilním obvazem. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, protože neozetžené poleptání může mít za následek pomalé hojení ran.

V případě zasažení očí: opotevřete oční víčka a promývejte oči minimálně 15 minut pod tekoucí vodou.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požití: Vymyjte ústa velkým množstvím vody. Pijte hodně vody. Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékaře nebo sanitku s pohotovostním lékařem. Ukažte tento obal nebo etiketu. Nebezpečí perforace.

LEKÁŘSKÁ POMOC: V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažena v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko:

Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +40224919293 nebo +40224915402

Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní pokyny:

H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při vdechování. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H341 Podezření na genetické poškození.

H350 Může vyvolat rakovinu. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mihlu/páru/aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně umyjte ruce.

P303 + P361 + P353 Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě sejměte. Opláchněte vodou/osprchujte. P304+P340 Při VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P305 + P351 + P338 Při ZASAŽENÍ OČÍ:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vymout snadno.

Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Účinné látky: 199 g/kg Formaldehyd, 50 g/kg Glutardialdehyd, 50 g/kg Dicedicymethylammoniumchlorid



nebezpečí



Obsah: 10l